

# TRIOXAZIN®

238

Trimetozin n. m.

tabletki

Trankwilizator, środek uspakajający.

Tabletka zawiera 0,3 g 3,4,5-Trójmetoksybenzoilo-N-czterohydroksysyny.

**Działanie:** Lek wykazuje działanie uspakajające. Należy do tzw. małych trankwilizatorów. W doświadczeniach na zwierzętach udowodniono, że podanie doustne Trioxaziny, skutecznie hamuje stany pobudzenia wywołane morfina i psychedryną. Zmniejsza drgawki wywołane kardiazolem, słabiej działa na drgawki wywołane strychniną.

Działanie leku występuje w 15 minut po podaniu go i utrzymuje się jego działanie przez 3—4 godziny. Po podaniu Trioxaziny, chorzy popudzeni uspakajają się. Podniecenie, niepokój i uczucie lęku oraz inne objawy nerwicy ustępują. Zaletą Trioxaziny jest to, że nie wywołuje ona senności oraz nie osłabia czynności umysłowych.

Wzmacnia działanie środków nasennych oraz działanie przeciwbólowe morfiny. Lek jest bardzo mało toksyczny. Nie działa rozluźniająco na mięśnie.

**Wskazania:** Różnego rodzaju nerwice, stany niepokoju leku zaburzenia snu na tle nerwowym.

Nerwice sytuacyjne. W napięciu nerwowym przed egzaminem, wykładem, podróżą przed zabiegiem chirurgicznym. Napięcie przedmiesiączkowe. Okres przekwitania. W czasie leczenia odwykowego u alkoholików.

**Objawy uboczne:** Dotychczas nie zauważono, nawet po kilkumiesięcznym stosowaniu leku, żadnych, poważnych objawów ubocznych. Badania układu krwiotwórczego, wątroby, nerek nie wykazały żadnych zmian po długotrwałym stosowaniu Trioxaziny. Czasami występująca suchość błon śluzowych jamy ustnej i gardła, ustępuje po zmniejszeniu dawki leku.

**Dawkowanie:** Indywidualnie, według wskazań lekarza. Preciętnie podaje się dorosłym 0,9—1,8 g na dobę (3—6 tabletek). W cięższych przypadkach można dawkę leku zwiększyć do 2,4—3,0 g na dobę. Dzieciom podaje się dawki mniejsze, w zależności od wieku.

### Postać leku i opakowanie:

Tabletki po 0,3 g, w opakowaniu 20 i 200 sztuk.



ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE, BUDAPEST · WĘGRY

® nazwa zastrzeżona.

2291102-11

